

# BIOHIDRAMAR<sup>®</sup> *cuaje*



***Potenciador del cuajado***




C/ Dublín, 1 (Edificio Sevilla) • 28232 LAS ROZAS (Madrid)  
Tel. 91 352 43 96 • Fax 91 352 40 70 • [comunicaciones@agrometodos.com](mailto:comunicaciones@agrometodos.com)



PYME INNOVADORA  
Válido hasta el 31 de julio de 2021





Es una formulación cuidadosamente estudiada que contiene **complejos naturales muy ricos** en citoquininas y una mezcla equilibrada de **microelementos (Zn, Mn, Fe, B, ...)** convenientemente complejados, cuya asociación aporta una **elevada actividad energética sobre determinados procesos metabólicos y fisiológicos** de la planta.

### MODO, DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN DE BIOHIDRAMAR® CUAJE

Se aplica:

**Vía foliar: 100 cc/hl**

Es aplicable en gran variedad de cultivos, siendo especialmente recomendado en los siguientes momentos:

- **Aguacate y kiwi:** desde inicio de floración.
- **Cítricos:** desde el 90% de caída de pétalos. En cítricos, está especialmente indicado en variedades con problemas de cuajado, que no responden a las aplicaciones exógenas de giberelinas.
- **Fresa y hortalizas:** desde la aparición de las primeras flores hasta el cuajado de los frutos repitiendo la aplicación tantas veces como sean necesarias.
- **Uva de mesa/vinificación:** desde inicio de floración. En variedades donde se necesita un aporte de citoquininas para poder cuajar las bayas.



*Momento idóneo para la aplicación de BIOHIDRAMAR® CUAJE en cítricos, sandía, fresa, kiwi, aguacate y uva de mesa.*

### CARACTERÍSTICAS DE BIOHIDRAMAR® CUAJE

- Respeta la fauna auxiliar.
- Sin residuos ni plazo de seguridad.
- Es un producto autorizado en Agricultura Ecológica.



### BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE BIOHIDRAMAR® CUAJE

BIOHIDRAMAR® CUAJE nos asegura:

- Estimular la división celular y favorecer la síntesis protéica.
- Incrementar la inducción floral.
- Aumentar la calidad del polen.
- Mayor número de flores uniformes y fértiles.
- Incrementar la translocación de metabolitos hacia los ovarios en proceso de cuajado: "**efecto sumidero**".
- Mejor cuajado.
- Precocidad en la producción.
- Mayor porcentaje de frutos comerciales.

El cuajado del fruto está regulado hormonalmente, por ello debemos tener en cuenta que la disponibilidad de agua y elementos nutricionales es imprescindible para que éste llegue a buen término.

### COMPATIBILIDADES Y MEZCLAS DE BIOHIDRAMAR® CUAJE

Es compatible con la mayoría de preparados fitosanitarios empleados normalmente. Para conocer con más detalles nuestras recomendaciones, contacte con nuestro departamento técnico.

Síguenos en:

