

LOS BENEFICIOS DE LA GAMA FRONTLINE®

1 Una única marca para perros, gatos y hurones



2 Un balance óptimo


EFICACIA = SEGURIDAD

3 Control en la mascota y el hogar



4 Todo en una pipeta

FIPRONIL
ACCIÓN
INSECTICIDA/
ACARICIDA
POTENTE



S-METOPRENO
ACCIÓN OVICIDA
Y LARVICIDA
EN PULGAS



5 Para hembras gestantes y lactantes

6 Flexibilidad: cajas de 1, 3 y 6 pipetas

7 Resistente a la lluvia, a los baños y al champú

FRONTLINE Combo®
Spot-On Fipronil ++ (S)-metopreno

FRONTLINE® COMBO SPOT-ON. Composición cualitativa y cuantitativa: Cada 100ml de Frontline® Combo Spot on Perro contiene: Fipronil 10g; (S)-metopreno 9g; butilhidroxianisól (E320) 0,02 g; butilhidroxitolueno (E321) 0,01 g; etanol 79g y excipiente cps. Cada 100ml de Frontline® Combo Spot on Gato contiene: fipronil 10g; (S) metopreno 12g; butilhidroxianisól (E320) 0,02 g; butilhidroxitolueno (E321) 0,01 g; etanol 79g y excipiente cps. Forma farmacéutica: Solución para unción dorsal puntual (Spot-on). Indicaciones de uso: para perros, gatos y hurones. El producto puede utilizarse frente a las infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. Eliminación de pulgas (*Ctenocephalides* spp.). En el perro, la eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante 8 semanas, y en los gatos y hurones, durante 4 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) que se generan de huevos puestos por pulgas adultas durante 8 semanas en el perro y 6 semanas en el gato, después de la aplicación. Eliminación de garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, en el perro; *Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, en el gato; *Ixodes ricinus* en el hurón). El producto tiene una eficacia acaricida en el perro y hurón que persiste hasta 4 semanas frente a garrapatas, y 2 semanas en el gato. Eliminación de piojos picadores (*Trichodectes canis* y *Felicola subrostratus*). El producto puede utilizarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAPP). Contraindicaciones: En ausencia de datos disponibles, el producto no debe utilizarse en cachorros y gatitos de menos de 8 semanas de edad, cachorros que pesen menos de 2kg, gatitos que pesen menos de 1kg y hurones menores de 6 meses de edad. No utilizar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre...) o convalecientes. No utilizar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas, incluso con resultado de muerte. No utilizar en gatos las presentaciones destinadas para el perro, ya que esto podría llevar a sobredosificación. Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): en caso de lamido, puede observarse un breve periodo de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente. Entre las reacciones adversas muy raras que se han observado después de la utilización del producto se encuentran: reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (decoloración de la piel, escamas, pérdida de pelo local, picor, rojez), así como picor general o pérdida de pelo. Tras la administración del medicamento, se ha podido observar salivación excesiva, síntomas nerviosos reversibles (sensibilidad a la estimulación incrementada, depresión, otros signos nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios. Administrar la dosis recomendada. Precauciones especiales de uso: Es importante asegurarse de que el producto se aplica en un área en la que el animal no pueda chuparse y de que los animales no se chupen unos a otros después del tratamiento. En el perro, deben evitarse los baños/immersiones en agua durante los dos días siguientes a la aplicación del producto, así como baños más frecuentes que una vez por semana, ya que no se han realizado estudios para investigar cómo afecta esto a la eficacia del producto. Antes del tratamiento, pueden utilizarse champús emolientes, pero reducen la duración de la protección frente a las pulgas a aproximadamente 5 semanas cuando se utilizan semanalmente después de la aplicación del producto. Un baño semanal con un champú medicado de clorhexidina al 2% no afectó la eficacia contra las pulgas durante un estudio de 6 semanas de duración. No se debería permitir que los perros nadasen en arroyos o estanques durante los 2 días después de la aplicación. No se dispone de datos sobre el efecto de la inmersión en agua/baños con jabón sobre la eficacia del producto en gatos ni en hurones. No obstante, en base a la información disponible en perros bañados con champú a partir de 2 días después de la aplicación del producto, no se recomienda bañar a los animales dentro de los dos días después de la aplicación del producto. Puede haber una adhesión de garrapatas solas. Por esta razón, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfavorables. Las pulgas de los animales a menudo infestan la cesta, el lecho y las áreas de descanso de éstos, como alfombras y cierto tipo de mobiliario que debería ser tratado, en caso de infestación masiva, con un insecticida adecuado, al inicio de las medidas de control y limpiado regularmente con aspiradora. Este producto puede causar irritación ocular, de la piel y de la mucosa. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos. Los animales o los operarios con hipersensibilidad conocida a los insecticidas o al alcohol deben evitar el contacto con Frontline Combo Spot-on Perro. Evitar el contacto del producto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse las manos con agua y jabón. Después de la exposición ocular accidental, aclarar el ojo suavemente con agua pura. Lavarse las manos después de su uso. Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto de aplicación del producto esté seco, y no se debería autorizar a los niños a jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación estuviera seco. Por lo tanto se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se traten al atardecer, y que estos animales recientemente tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Posología: en perros, la dosis mínima recomendada es de 6,7 mg/kg de fipronil y 6 mg/kg de (S) metopreno, por aplicación tópica sobre la piel, correspondiente a: una pipeta de 0,67 ml (2-10 kg) por perro de más de 2 kg hasta 10 kg; 1,34 ml (10-20 kg), por perro de más de 10 kg hasta 20 kg; 2,68 ml (20-40 kg) por perro de más de 20 kg hasta 40 kg; 4,02 ml (> 40 kg) por perro de más de 40 kg. Una pipeta de 0,5 ml por gato correspondiente a la dosis mínima recomendada de 5 mg/kg de fipronil y de 6 mg/kg de (S)-metopreno, por aplicación tópica sobre la piel. Una pipeta de 0,5 ml por hurón correspondiente a una dosis de 50 mg de fipronil y 60 mg de (S)-metopreno por hurón, por aplicación tópica sobre la piel. En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas. Método de administración: sujetar la pipeta en posición vertical. Dar un golpecito en la parte estrecha de la pipeta para asegurar que el contenido se encuentra en la parte principal de la pipeta. Abrir la punta. Separar el pelo del animal por la base del cuello frente a los omoplatos hasta hacer visible la piel. Situar la punta de la pipeta en la piel y apretar la pipeta varias veces hasta vaciar por completo su contenido directamente sobre la piel en un único punto. Se han podido observar en el punto de aplicación cambios temporales en el pelo (pelo pegajoso, graso). Sobredosificaciones (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos): no se han observado reacciones adversas en estudios de seguridad realizados en la especie de destino, en cachorros y gatitos de 8 semanas de edad, perros en crecimiento y perros de 2kg y gatos de 1kg de peso aproximadamente, tratados de una vez a cinco veces con la dosis recomendada. El riesgo de presentarse reacciones adversas (véase reacciones adversas) no obstante puede aumentar cuando se sobredosifica, por lo tanto los animales deben ser tratados siempre con el tamaño correcto de pipeta correspondiente a su peso corporal. La aplicación de una sobredosificación del producto puede causar aspecto pegajoso del pelo en el punto de aplicación. No obstante, si ocurriera esto, desaparecerá dentro de las 24 horas después del tratamiento. En hurones de 6 meses de edad y mayores y tratados una vez cada 2 semanas durante 4 tratamientos, a cinco veces la dosis recomendada, se observó pérdida de peso en algunos animales. Precauciones especiales de almacenamiento: no almacenar por encima de 30°C. Almacenar en su envase original. Presentaciones comerciales y números administrativos de identificación: Frontline® Combo Spot on perro 2 - 10kg: N° de registro 1534 ESP 1 tarjeta blister de 1 pipeta de 0,67ml con la punta estriada. Frontline® Combo Spot on perro 10 - 20kg: N° de registro 1535 ESP 1 tarjeta blister con 1 pipeta de 1,34ml con la punta estriada. Frontline® Combo Spot on perro 20 - 40kg: N° de registro 1536 ESP 1 tarjeta blister con 1 pipeta de 2,68ml con la punta estriada. Frontline® Combo Spot on perro >40kg: N° de registro 1537 ESP 1 tarjeta blister con 1 pipeta de 4,02ml con la punta estriada. Frontline® Combo Spot on gato: N° de registro 1538 ESP 1 tarjeta blister con 1 pipeta de 0,50ml con la punta estriada. Nombre y dirección del titular de autorización de comercialización: MERIAL LABORATORIOS S.A Torre Diagonal Mar C/ Josep Pla nº 7, 2ª planta 08019 Barcelona. FABRICADO POR MERIAL 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon Francia.

PROFESME0661



FRONTLINE Combo®
Spot-On Fipronil ++ (S)-metopreno

Tranquilidad para tu mascota y tu hogar



pulgas



garrapatas



piojos



huevos



larvas




pupas



www.frontlinemascotas.es

PULGAS, HUEVOS, LARVAS: EL CICLO INTERMINABLE

Las diversas etapas de desarrollo de las pulgas:



Pulgas adultas

Se encuentran sobre la piel del animal picándole y provocando irritaciones. El animal se rasca, se lame y mordisquea. Sus picaduras pueden causar problemas dermatológicos y pueden transmitir enfermedades graves. Una pulga hembra puede poner una media de 20 a 30 huevos al día durante 2 meses.

Huevos

Son puestos sobre el animal pero después caen al suelo: moquetas, alfombras, mantas, etc. Dentro del huevo se va formando una larva.

Larvas

No infestan a los animales. Se mueven dispersándose por múltiples ubicaciones del hogar, como fibras de las alfombras, mantas, bajo los muebles, cama del animal, etc..., mudan y se convierten en pupas.

Pupas

Son muy difíciles de eliminar porque es una fase muy resistente. Además, pueden permanecer en un estado de reposo (con una nueva pulga en su interior) hasta 12 meses, esperando a que las condiciones sean favorables para que esta nueva pulga emerja y parasite otra vez al mismo animal, a otro o incluso a las personas.

¡Las garrapatas, una amenaza muy seria!

Las garrapatas transmiten enfermedades graves como la babesiosis, la ehrlichiosis/anaplasmosis o la enfermedad de Lyme entre muchas otras. A partir de las 48 horas de fijación de la garrapata, el riesgo de transmisión de estas enfermedades es máximo. FRONTLINE COMBO® mata las garrapatas por contacto en 48 horas.

FRONTLINE Combo®
Spot-On Fipronil ++ (S)-metopreno

Tranquilidad para tu mascota y tu hogar

de las pulgas
viven en el
entorno del
animal: cama,
sofá, alfombras
etc...

95%

5%

viven sobre
el propio
animal

LA GAMA FRONTLINE® OFRECE MULTITUD DE PRESENTACIONES QUE SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS PROPIETARIOS Y DE SUS MASCOTAS



PRESENTACIONES

MONOPIPETA 3 PIPETAS 6 PIPETAS

FRONTLINE COMBO®
Ahora también
para hurones



Frontline Combo® actúa frente a pulgas adultas, sus fases inmaduras (huevos, larvas), garrapatas y piojos picadores

MODO DE APLICACIÓN

Posología y frecuencia de aplicación:

1 PIPETA
X MES DURANTE
12 MESES



Aplicación:

- 1 Seleccione la presentación correcta correspondiente al peso del animal a tratar.
- 2 Mantenga la pipeta en posición vertical. Dé un golpecito en la parte estrecha para asegurarse de que el contenido permanece dentro del cuerpo principal de la pipeta. Rompa la punta de la pipeta.
- 3 Separe el pelaje del dorso del animal, en la base del cuello, entre los omoplatos (donde el animal no pueda lamerse), hasta que la piel sea visible.
- 4 Coloque la punta de la pipeta sobre la piel y apriete varias veces para vaciar totalmente su contenido. Aplicar la pipeta sólo en un punto.

Es necesario no bañar al animal durante las 48 horas posteriores a la aplicación de la pipeta.

