



**SmartFeed®**  
La croissance intelligente

**Celtilait**  
Aliments d'allaitement



La vaca lechera de alto rendimiento se cimenta desde el nacimiento

Optimice sus resultados adoptando el nuevo concepto de lactancia

# Celtilait Up!

Novedad


Lactoreemplazante para terneras de reposición

## El concepto SmartFeed

- Una fase de lactancia optimizada para preparar un parto precoz y una mayor producción lechera
- Una fórmula equilibrada (relación aminoácidos digeribles/energía metabolizada)
- Niveles nutricionales elevados (aminoácidos, materias grasas y lactosa)
- Una oferta de planes de alimentación adaptada a cada estrategia de cría

## Celtilait UP!


UN NUEVO E INNOVADOR CONCEPTO...



Evolución del contenido proteico para la optimización del perfil de aminoácidos

...PARA UNOS RESULTADOS CONVINCENTES

■ Lactoreemplazante 50 % de leche en polvo  
■ Celtilait UP!



Comparación de las GMD entre un alimento con un 50 % de leche en polvo y Celtilait UP!  
(ensayos realizados en la red de explotaciones de Celtilait)



# SmartFeed®

La croissance intelligente

**Celtilait**  
Aliments d'allaitement

Adaptado al uso en máquinas de distribución automática (DAL)

## Celtilait Up!

Lactoreemplazante para terneras de reposición

### GARANTÍAS

#### Composición

Lactosuero, Aceite de palma, Permeado de lactosuero, Proteína de trigo, Leche desnatada, Aceite de copra, Almidón(Trigo), Materias grasas de la leche, Carbonato de calcio, Harina de trigo, Bicarbonato de sodio, Cloruro de sodio, Sulfato de magnesio, Aceite de colza, Hidróxido de magnesio.

Solo contiene materias grasas vegetales y lácteas.

#### Componentes analíticos (%)

Proteína bruta	19,0
Materia grasa bruta	21,0
Celulosa bruta	0,1
Cenizas brutas	6,50
Calcio	1,20
Fósforo	0,50
Sodio	0,60

#### Aditivos por kg

<b>Antioxidante</b>	
E321 B.H.T.	38 mg
<b>Vitaminas</b>	
3a672a Vitamina A (Acetato de retinilo)	25 000 UI
3a671 Vitamina D3	10 000 UI
3a700 Vitamina E (acetato de alfa-tocoferol)	85 mg
<b>Oligoelementos</b>	
3b103 Hierro (sulfato ferroso monohidratado)	40 mg
3b405 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado)	10 mg
3b603 Zinc (óxido de zinc)	120 mg
3b503 Manganeso (sulfato manganeso monohidratado)	65 mg
3b202 Iodo (yodato de calcio anhidro)	0,1 mg
3b801 Selenio (selenito de sodio)	0,2 mg
<b>Estabilizador de la flora intestinal</b>	
4b1708 Enterococcus Faecium NCIMB 11181	1,5*10 <sup>9</sup> CFU

Las indicaciones de composición pueden variar en función del contexto de las materias primas

### MODO DE EMPLEO

- Consulte con su técnico.

### CONSEJOS DE USO

- Procurar que el material esté limpio.
- Limpiar los utensilios después de su uso.
- Volver a colocar en los baldes antes de apilar.
- Almacenar la leche en un lugar seco.
- Cerrar el saco tras su utilización.
- Mantener una temperatura de distribución de entre 38 y 40 °C.
- Comprobar periódicamente la potabilidad del agua mediante análisis.

### PLANES DE ALIMENTACIÓN ORIENTATIVOS

#### 2 comidas al día

Edad	Volumen de la comida	N.º comidas/día	Polvo de leche/comida	
1-4 días	2,0/2,5 litros	2	Calostro	min. de 4 litros de calostro antes de las 10/12 h de vida
5.º día mañana	2,0 litros	1	comida rehidratante	agua + paja o heno + pienso a voluntad
5.º día tarde	2,5 litros	1	0,360 kg	
6-7 días	2,5 litros	2	0,360 kg	
2.ª sem.	3,0 litros	2	0,430 kg	
3.ª a 6.ª sem.	3,5 litros	2	0,500 kg	
7.ª sem.	2,5 litros	2	0,360 kg	
8.ª sem.	2,5 litros	1	0,360 kg	
9.ª sem.	2,5 litros	1	0,360 kg	
10.ª sem.	2,5 litros	1	0,360 kg	
11.ª sem.	Destete cuando la ternera coma al menos 2 kg de pienso seco al día			

#### 1 comida al día a partir de la 3.ª semana

Edad	Volumen de la comida	N.º comidas/ día	Polvo de leche/comida		
1-4 días	2,0/2,5 litros	2	Calostro	min. de 4 litros de calostro antes de las 10/12 h de vida	
5.º día mañana	2,0 litros	1	comida rehidratante	agua + paja o heno + pienso a voluntad	
5.º día tarde	2,5 litros	1	0,360 kg		
6-7 días	2,5 litros	2	0,360 kg		
2.ª sem.	3,0 litros	2	0,430 kg		
3.ª sem	4,0 litros	1	0,800 kg		
4.ª a 6.ª sem.	4,5 litros	1	0,900 kg		
7.ª sem.	3,5 litros	1	0,700 kg		
8.ª sem.	2,5 litros	1	0,500 kg		
9.ª sem.	2,0 litros	1	0,400 kg		
10.ª sem.	2,0 litros	1	0,400 kg		
11.ª sem.	Destete cuando la ternera coma al menos 2 kg de pienso seco al día				

### NOTA

Nota sobre el calostro:

- Atención a la higiene: Recogida del calostro (ubres, recipiente, etc.)
- Evaluar la cantidad de calostro (peso para calostro o refractómetro)
- Distribuir de inmediato tras el tratamiento o la refrigeración
- 2 l en las 4 primeras horas de vida y 2 l a las 12 horas

Distribuido por:

01/07/2020\FT SmartFeed UP ESP

**Celtilait**  
Aliments d'allaitement

OUEST ELEVAGE - 380 Lesgall an Taro - CS 60068 - 29260 Ploudaniel - FRANCE  
Tél. (33) 02 98 36 21 80 - Fax (33) 02 98 36 21 89  
<http://www.celtilait.com> - e-mail : [celtilait@celtilait.com](mailto:celtilait@celtilait.com)