

Aplicación de Chronogest® 20mg



PASO A PASO



Accede al video sobre buenas prácticas en la puesta de esponjas



1- SELECCIÓN DE LOTES

Seleccionaremos los lotes de animales para cubrir con este método atendiendo a, si son de aptitud carne, que lleven 2 meses paridas o estén vacías por ecógrafo. En las ganaderías de leche de alta producción, para obtener los mejores resultados, podemos utilizar este método después del pico de lactación, alrededor de 3-4 meses post-parto.

2- PREPARACIÓN DE MATERIALES

El día de colocación de esponjas dispondremos de todo el material necesario: guantes de un solo uso, aplicadores, las esponjas y un cubo de agua con desinfectante para la desinfección de los aplicadores entre aplicaciones.



3- EXPLORACIÓN PREVIA

Es ideal realizar una exploración vaginal de las hembras a tratar. Nos permite detectar posibles anomalías en las hembras como atresia vaginal, himen fibroso, etc. En el caso de las corderas procederemos a desvirgarlas con el aplicador correspondiente.


4- APLICACIÓN DE CHRONOGEST®

Colocaremos la esponja en el aplicador, lo introduciremos en la vagina con suavidad y finalmente nos ayudaremos del émbolo para dejar la esponja colocada en el fondo de la vagina.



5- RETIRADA DE CHRONOGEST®

Posteriormente sacaremos el émbolo y el aplicador quedando el hilo por fuera de la vagina. En el momento de la retirada, ayudándonos con un espéculo vaginal, procederemos a la extracción de la misma. Introduciremos el espéculo cerrado en la vagina y, una vez dentro, abriremos el espéculo y visualizaremos la esponja (podemos ayudarnos con una linterna). Con la ayuda de una pinza extraeremos la esponja. Esta práctica permitirá reducir posibles irritaciones en la mucosa vaginal, especialmente en corderas debido a su menor tamaño. Después de retirarla procederemos a inyectar por vía intramuscular la dosis correspondiente para cada caso de PMSG.



PREPARADAS, LISTAS...

iYA!



Chronogest 20mg
liberación controlada

MSD
Animal Health