

El **calostro** es el pilar fundamental para asegurar la salud de la recría en sus primeras semanas de vida.

Un **correcto encalostado es clave**, ya que la producción futura de las corderas dependerá, en gran medida, del manejo que hagamos sus primeros meses de vida.

CALIDAD

>24% BRIX

CON REFRACTÓMETRO DE BRIX

>75 G/LITR

CON CALOSTRÍMETRO

° Brix	Calidad	G/L
<20	Malo	<50
20-24	Medio	50-75
24-29	Bueno	75-100
>30	Excelente	>100

CANTIDAD

10% PESO VIVO (± 400 ML)

La administración se adaptará según el manejo de la granja

MADRE
 BIBERÓN
 SONTA
 CUBO

CUÁNDO

- Una solución para poder administrar el calostro rápidamente es tener un banco de calostro:

REFRIGERADO

- 3-7 días, 10 días pasteurizado
- Atemperar al baño María (<50°C)
- No usar microondas

CONGELADO

- Dura 6 meses

RAPIDEZ EN LAS 6 PRIMERAS HORAS

SUGERENCIA: clasificar calostro por fecha y calidad

CONTAMINACIÓN

- MAXIMIZAR LA HIGIENE** (máquina ordeño, cubos, biberones...)
- REFRIGERAR** si no se va a usar de inmediato para controlar el crecimiento bacteriano

Imágenes: Fuente IDELE (www.idele.fr)

Accede al vídeo sobre buenas prácticas en el manejo del calostro:



OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA

- **Un adecuado plan sanitario de las madres:** vacunar a las hembras en preparto es fundamental para asegurar la transferencia de inmunidad a sus crías a través del calostro.
- **Alimentar correctamente a las madres en preparto** para que tengan una adecuada condición corporal al parto (3-3,5) y así asegurar que la calidad y cantidad de calostro sea suficiente para sus crías.